

2019 ACCURE-Trial

Wat is het effect van een blindedarmverwijdering (appendectomie) op het ziektebeloop van colitis ulcerosa?

De laatste jaren komt er steeds meer bewijs dat de blindedarm een rol speelt in het afweersysteem bij patiënten met colitis ulcerosa. Een blindedarmverwijdering lijkt geassocieerd met een lager risico op een opvlaming, vermindering in het medicatiegebruik en mogelijk het voorkomen van een colectomie. Om antwoord te krijgen op deze vraag is in 2012 de ACCURE-trial van start gegaan.

Doel van het onderzoek

Uitzoeken of het verwijderen van de blindedarm (de appendix) effect heeft op het ziektebeloop van colitis ulcerosa.

Doelgroep

Alle colitis ulcerosa patiënten vanaf 18 jaar en ouder die in de afgelopen 12 maanden zijn behandeld met medicijnen totdat de ziekte tot rust is gekomen komen in aanmerking voor deze studie.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek worden 2 groepen met elkaar vergeleken: een groep mensen die een blindedarmverwijdering ondergaat en een groep mensen die geen blindedarmverwijdering ondergaat. Doormiddel van loting zal bepaald worden tot welke groep u behoort. Indien u loot voor een blinde darmverwijdering zult u deze ondergaan via een kijkoperatie in dagbehandeling. In beide gevallen zullen we gedurende 1 jaar uw ziektebeloop volgen. Om een verschil tussen de twee groepen aan te tonen zijn er 184 mensen nodig, inmiddels doen er al 122 mensen mee aan de ACCURE-trial.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek of heeft u vragen; neem dan graag contact op met de arts-onderzoeker in het AMC: Lianne Heuthorst, l.heuthorst@amsterdamumc.nl