

2020 COSTA-study

Wat is het effect van een blindedarmverwijdering (appendectomie) op het ziektebeloop van mensen met colitis ulcerosa die ondanks biological gebruik nog klachten hebben?

Om antwoord te krijgen op deze vraag is in 2019 de COSTA-studie van start gegaan.

De laatste jaren komt er steeds meer bewijs dat de blindedarm een rol speelt in het afweersysteem bij mensen met colitis ulcerosa. Een blindedarmverwijdering lijkt verband te hebben met een lager risico op een opvlaming, vermindering in het medicatiegebruik en mogelijk met het voorkomen van een colectomie (verwijdering van de dikke darm).

Doel van het onderzoek

Uitzoeken of het verwijderen van de blindedarm (de appendix) effect heeft op het ziektebeloop van colitis ulcerosa.

Doelgroep

Alle mensen met colitis ulcerosa van 18 jaar en ouder die ondanks biological-gebruik nog klachten hebben.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek worden 2 groepen met elkaar vergeleken: een groep mensen die een blindedarmverwijdering ondergaat en een groep mensen die geen blindedarmverwijdering ondergaat.

Indien de chirurg de optie tot blindedarmverwijdering aan u voorstelt en u wil daarna overgaan tot deze operatie, dan zal dat daadwerkelijk gebeuren. U hoeft dus niet te loten bij deze studie. De blindedarmverwijdering gaat via een kijkoperatie tijdens een dagbehandeling. We volgen daarna gedurende 1 jaar uw ziektebeloop. We moeten 67 mensen opereren om het effect goed te kunnen evalueren. Inmiddels doen er 14 mensen mee.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek of heeft u vragen; neem dan graag contact op met de onderzoeker in het AMC: Maud Reijntjes, m.a.reijntjes@amsterdamumc.nl, tel: 020-5662153.