

Mesalazines

Stofnaam	Merksnaam	Generiek (zonder merksnaam)
mesalazine	Asacol®	Mesalazine
	Mezavant®	
	Pentasa®	
	Salofalk®	
	Kiudro®	
Yaldigo®		
olsalazine	Dipentum®	Olsalazine
sulfasalazine	Salazopyrine®	Sulfasalazine



Wanneer krijg je mesalazine?

Mesalazines worden ingezet bij chronische dikke darmontstekingen. Ze remmen op verschillende manieren de ontsteking in de darmen. Je krijgt mesalazines bij colitis ulcerosa en in specifieke gevallen bij de ziekte van Crohn:

- Als inductiebehandeling (om de ziekte rustig te krijgen).
- Als onderhoudsbehandeling (om de ziekte rustig te houden).

Hoe werkt mesalazine?

Het is niet helemaal duidelijk hoe mesalazine werkt. Mesalazine remt onder andere de vorming van stoffen die vrijkomen bij een ontsteking en houdt de agressieve stoffen tegen die bij een ontsteking vrijkomen. Dit voorkomt het ontstaan van een ontsteking en zorgt ervoor dat een ontsteking verdwijnt. Mesalazine heeft minder effect bij de behandeling van de ziekte van Crohn, en wordt daarom minder ingezet bij deze ziekte.

Welke mesalazines?

Er zijn verschillende mesalazines. Elke mesalazine werkt op een andere manier in het maag-darmkanaal. Het middel dat je krijgt hangt vooral af van de plaats van de ontsteking.

- Asacol® komt vrij in het laatste deel van de dunne darm en dikke darm.
- Kiudro® komt vrij in het laatste deel van de dikke darm.
- Mezavant®, Yaldigo®, sulfasalazine, olsalazine (Dipentum®) komen voornamelijk vrij in de dikke darm.
- Pentasa® komt geleidelijk vrij in de hele dunne darm tot en met de dikke darm.
- Salofalk® komt vooral vrij aan het einde van de dunne darm en de dikke darm.
- Generieke mesalazines (merkloos) kunnen op diverse plaatsen in de darm vrijkomen.

Let op!

- Omdat Asacol®, Kiudro®, mesalazine, Mezavant®, Pentasa® en Salofalk® op verschillende plaatsen in het maag-darmkanaal vrijkomen, kunnen ze niet onderling worden vervangen. Ook kun je de verschillende toedieningsvormen (tablet, korrel, klysma, schuim en zetpil) niet zomaar wisselen.
- Het kan voorkomen dat je het medicijnomhulsel in de ontlasting vindt. De mesalazine is dan wel gewoon in de darm vrijgekomen.
- Bij gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld mesalazine, olsalazine, sulfasalazine en sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen is het noodzakelijk om je bloed te laten controleren en je medicatie eventueel aan te passen. Stel je arts op de hoogte van het gebruik van deze medicatie.

Niet alle medicijnen zijn uitwisselbaar

Wisselen van merk medicijn door gedwongen overstappen op een ander merk kan voorkomen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: voorkeursbeleid van zorgverzekeraars, inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers, of tekorten. In bepaalde gevallen brengt het wisselen van mesalazines risico's voor je gezondheid met zich mee. In dat geval besluit de arts in samenspraak met jou dat een specifiek merk nodig is voor optimale behandeling.

Meldpunt medicijnproblemen

Zijn jouw medicijnen niet meer te krijgen of moet je verplicht overstappen op een ander medicijn?



Bijwerkingen

(voor alle bijwerkingen zie de medicijn-bijsluiter)

Mesalazine

- Bij het gebruik van een klysma, schuim of zetpillen kun je last krijgen van een prikkelend gevoel in het laatste deel van de darm.
- Bij gebruik van tabletten, capsules of granulaat kun je last krijgen van maag- of darmklachten zoals buikpijn, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Dit kun je meestal voorkomen door ze tijdens of net na een maaltijd in te nemen.
- Sommige mensen krijgen last van hoofdpijn en/of duizeligheid.
- Heel soms komen nierontsteking, alveesklierontsteking of leverontsteking voor, vermoedelijk als een soort overgevoeligheidsreactie. Daarom controleert je arts het bloed minimaal één keer per jaar.



Olsalazine

- Diarree komt vaak voor.
- Misselijkheid en buikpijn. Door het middel in te nemen tijdens of net na de maaltijd verklein je de kans hierop.

Sulfasalazine

- De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmklachten zoals buikpijn, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken, hoofdpijn, duizeligheid, stemmingsveranderingen of overgevoeligheid. Bij gebruik van tabletten of suspensie (drank) kun je maag- of darmklachten voorkomen door de medicijnen in te nemen tijdens of net na een maaltijd.
- Bij het gebruik van zetpillen kun je een prikkelend gevoel in de anus krijgen. Wanneer je tabletten of drank gebruikt, kan de urine en ontlasting een gele of oranje kleur hebben. Dit heeft verder geen ernstige gevolgen.
- Minder vaak komt diarree voor. Door de dosering langzaam op te bouwen kun je dit meestal voorkomen.

Neem contact op met je arts bij:

- Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, benauwdheid, gewrichtspijn, een pijnlijke tong of koorts.
- Overgevoeligheidsreacties kunnen ook door Uv-licht ontstaan (bijvoorbeeld van de zon of zonnebank).

Kinderwens en zwangerschap



Mesalazine en olsalazine

- Overleg altijd met je arts over het gebruik wanneer je zwanger wilt worden of dat al bent.
- Mannen kunnen deze middelen blijven gebruiken als er een zwangerschapswens is.
- Je kunt deze middelen gebruiken zonder gevaar voor de ongeboren baby.

Sulfasalazine

- Gebruik foliumzuur tijdens de preconceptie en gedurende de hele zwangerschap.
- Tijdens het gebruik van Sulfasalazine kan de vruchtbaarheid bij mannen afnemen. Na het stoppen van de therapie komt de vruchtbaarheid weer terug.

Borstvoeding

De werkzame stof van mesalazine, olsalazine en Sulfasalazine gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. In heel zeldzame gevallen kan je kind hierdoor diarree krijgen. Overleg met je arts over het gebruik van je medicatie voordat je borstvoeding wilt geven.

Meer informatie over medicijnen

- Op www.crohn-colitis.nl vind je meer informatie over mesalazines en andere IBD-medicatie
- Je kunt onze brochure 'Medicijnen bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa' downloaden en bestellen via de website
- Je kunt de factsheets mesalazines, corticosteroiden, immunosuppressiva en biologische geneesmiddelen downloaden en bestellen via de website.