

Tips voor een veilig medicijngebruik

1

Informeer uw arts zo volledig mogelijk



2

Meld uw arts dat u bloedverdunners gebruikt




3

Stop nooit zomaar met het innemen van medicijnen en meld bijwerkingen



4

Let op als uw medicijnen of de verpakking er anders uitzien



5

Vraag na uw revalidatiebehandeling om een nieuw medicatieoverzicht



6

Wees voorzichtig met het combineren van medicijnen



Tips voor een veilig medicijngebruik




Informeer uw arts zo volledig mogelijk

Het is belangrijk om uw arts te vertellen over uw persoonlijke situatie om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld allergie, alcohol en drugs van invloed op de werking van uw medicijnen. Overhandig bij opname een overzicht van de medicijnen die u (thuis) gebruikt. De arts zal uw informatie altijd vertrouwelijk behandelen.



Meld uw arts dat u bloedverdunders gebruikt

Als u bloedverdunders gebruikt, stolt uw bloed minder snel en hebt u meer kans op bloedingen. Daarom is het belangrijk om aan uw arts te vertellen dat u bloedverdunders gebruikt.



Stop nooit zomaar met het innemen van medicijnen en meld bijwerkingen

Het kan gevaarlijk zijn als u ineens (tijdelijk) stopt met het innemen van medicijnen. Heeft u last van bijwerkingen, overleg dan met de arts of de verpleging over wat daaraan te doen is. Overleg ook wat u moet doen als u een keer vergeet om uw medicijnen in te nemen.



Let op als uw medicijnen of de verpakking er anders uitzien

Als de medicijnen of de verpakking er anders uitzien dan u gewend bent, vraag dan altijd na of deze wel voor u bestemd zijn. Het kan ook zijn dat het andere geneesmiddelen zijn die dezelfde werking hebben als de medicijnen die u eerder al gebruikte.



Vraag na uw revalidatiebehandeling om een nieuw medicatieoverzicht

Vraag om een compleet nieuw overzicht van alle medicijnen als u na uw revalidatiebehandeling nieuwe of andere medicijnen voorgeschreven krijgt naast de geneesmiddelen die u al gebruikt. Dit overzicht kunt u ook bij uw apotheek laten zien als u nieuwe medicijnen gaat halen.



Wees voorzichtig met het combineren van medicijnen

Als u na ontslag uit het revalidatiecentrum aanvullende medicijnen, zelfzorgmiddelen, homeopathische middelen, vitaminepreparaten of dieetproducten koopt (bijvoorbeeld bij de drogist), dan kan dat in combinatie met uw andere medicijnen gevaarlijke bijwerkingen geven. Lees de bijsluiters van uw medicijnen en overleg bij twijfel met uw huisarts of apotheker.