



in inflammatoire darmziekten (Cleveland Clinic Florida, Cleveland Clinic Foundation, Mayo Clinics, Ochsner Clinic en Mount Sinai Hospital) zijn we ook in het Academisch Ziekenhuis Leiden begin 1995 gestart met het verrichten van laparoscopisch ondersteunde verwijdering van het laatste stukje dunne darm en eerste stukje dikke darm.

"Ondersteund" wil in dit verband zeggen dat het laatste stukje dunne darm en het rechterdeel van de dikke darm met de laparoscoop worden losgemaakt. Daarna wordt via een klein

sneetje door de navel dit vrijgemaakte stuk darm naar buiten gehaald. Vervolgens kunnen we dan op de "gewone" manier de bloedvatvoorziening van de darm afbinden, de darm doornemen en de anastomose maken. De darm met de nieuwe anastomose wordt dan via het kleine gaatje weer in de buik teruggelegd.

Boven:
resultaat na kijk-
operatie

Onder:
resultaat na "open"
darmoperatie



De laparoscopische operatie heeft in ons ziekenhuis zeker de voorkeur boven de "open" operatie.

gaan tot een "open" operatie. Dan wordt de patiënt geconfronteerd met zowel de nadelen van de "open" als van de kijkoperatie.

Sinds januari 1995 hebben we alle patiënten die in aanmerking kwamen voor een verwijdering van het laatste stukje dunne darm en het eerste stukje dikke darm met behulp van een kijkoperatie geopereerd. Slechts eenmaal lukte het niet om de operatie op deze wijze uit te voeren. Zoals verwacht, was

het ziekenhuisverblijf na de operatie kort, gemiddeld zes dagen. Opvallend was met name het zeer fraaie cosmetische resultaat. De laparoscopische operatie is hierbij een veilig alternatief gebleken voor de "open" ileocecaalresectie en heeft in ons ziekenhuis zeker de voorkeur boven de "open" operatie.

Overigens is het voordeel van de laparoscopische darmoperaties (bijvoorbeeld op de pijn na de operatie, de lengte van het verblijf in het ziekenhuis na de operatie en het effect op de afweer) nog geenszins bewezen. Dit kan pas wanneer de resultaten van chirurgen met grote ervaring in laparoscopische chirurgie vergeleken worden met de resultaten van chirurgen die de operatie op de conventionele wijze verrichten.

Hoe het ook zij, een jaar na de operatie is het enige belangrijke dat nog telt na een doorgemaakte operatie het litteken en dat is na de laparoscopische operatie nog maar nauwelijks zichtbaar.

* W.A. Bemelman en G. Griffioen zijn respectievelijk werkzaam op de afdelingen maag-darm-lever chirurgie en maag-darm-leverziekten van het Academisch Ziekenhuis Leiden.

Verklaring van gebruikte termen:

- laparoscopie = kijkoperatie.
 laparoscopisch = door middel van een kijkoperatie.
 laparoscoop = het instrument waarmee de kijkoperatie wordt uitgevoerd.
 anastomose = nieuwe verbinding.
 ileocecaal resectie = verwijdering van het laatste stukje dunne darm en het eerste stukje dikke darm.